Ministério da Educação

Universidade Federal do Paraná - UFPR

Departamento de Matemática

Programa de Pós-Graduação em Matemática

Exame de Qualificação: Álgebra Linear Avançada (Agosto 2017)

Banca Examinadora:

- Prof. Edson Ribeiro Alvares
- Prof. Olivier Brahic
- Prof. Marcelo Muniz Silva Alves

Instruções:

- a) A prova tem uma duração de 3 horas;
- b) Cada questão escolhida vale 2,0 pontos. A prova tem um total de 10,0 pontos;
- d) Justifique todas as suas respostas.

Nome do aluno:

Questões

- (1) Seja $T: M_n(\mathbb{R}) \to M_n(\mathbb{R})$ o operador linear que leva uma matriz em sua transposta.
 - (a) Mostre que T é diagonalizável.
 - (b) Determine os autovalores de T, as dimensões dos autoespaços e uma base de $M_n(\mathbb{R})$ formada por autovetores de T.
- (2) Descreva as possíveis formas canônicas de Jordan para matrizes 6×6 sobre \mathbb{C} que têm polinômio característico $(x-1)^2(x-4)^4$.
- (3) Seja V um espaço vetorial complexo de dimensão finita. Prove que as seguintes afirmações são equivalentes:
 - (a) T é diagonalizável e $T^{2n} = T^n$
 - (b) $T^{n+1} = T$.
- (4) Sejam V um espaço vetorial sobre um corpo F de dimensão n e $c_1, \dots, c_n \in F$ e g_1, \dots, g_n funcionais lineares linearmente independentes. Prove que existe um único vetor $v \in V$ tal que $g_i v = c_i$ para todo i.
- (5) Seja n um inteiro positivo e E o \mathbb{R} -espaço vetorial dos polinômios com coeficientes reais, nulo ou de grau inferior ou igual à n. Seja A um polinômio com coeficientes reais, unitário e de grau n+1. Seja $f: E \to E$ a aplicação que a todo polinômio P de E associa o resto da divisão euclidiana de XP por A.
 - i) Mostre que a aplicação f é linear.
 - ii) Qual é a matriz de f na base $\{1, X, \dots, X^n\}$ de E.
 - iii) Calcule o polinômio característico de f.
 - iv) Seja λ um valor próprio de f. Mostre que λ é raiz de A e que o espaço próprio para o valor próprio λ é a reta gerada pelo polinômio $\frac{A}{X-\lambda}$.

v) Mostre que o endomorfismo f é diagonalizavel, se e somente se, o polinômio A tem n+1 raizes reais e distintas.